

# CHIAVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI GENERI DELLE BOLETACEAE

Generi	Cappello	Tubuli	Pori	Gambo	Carne	Spore
<b>Aureoboletus</b>	Vischioso, piccole dimensioni.	Giallo oro	Giallo intenso, minuti, angolosi	Vischioso, liscio, privo di reticolo	Esigua, presto molle, immutabile, acidula.	Ellittiche, bruno-olivastre
<b>Boletinus</b>	Cuticola pelosa o squamosa	Corti, decorrenti sul gambo, difficilmente staccabili.	Molto ampi, allungati radialmente.	Cavo, presenza di velo o anello	Scarsa	Oblunghe o fusiformi, giallo olivastre
<b>Boletus</b>	Carnoso, di grandi dimensioni, glabro o finemente feltrato.	Lunghi, separabili gli uni dagli altri, bianchi, gialli, poi olivastri.	Piccoli, rotondi, prima chiusi, dello stesso colore dei tubuli o aranciati o rossi.	Robusto, ventricoso, carnoso, con o senza reticolo o punteggiatura	Soda, immutabile o virante al tocco e al taglio.	Grandi, fusiformi, bruno olivacee
<b>Buchwaldoboletus = Pulveroboletus</b>	Poco vischioso, pruinoso.	Imenoforo molto corto, concavo, giallo poi olivastro	Giallo-olivastri, piccoli.	Pruinoso, privo di reticolo. Habitat lignicolo.	Virante all'azzurro, molle.	Lisce, ellittiche, bruno-olivastre
<b>Chalciporus</b>	Poco vischioso, piccole dimensioni.	Arancio-cannella, bruno-ruggine, rosei o vinati.	Arancio-cannella, bruno-ruggine, rosei o vinati, grandi e angolosi	Con micelio basale giallo solforino.	Piccante o amara, giallo-oro in fondo al gambo.	Ellittico-fusiformi, bruno-ruggine
<b>Gyrodon</b>	Carnoso, imputrescibile, a umido viscoso.	Cortissimi, molto decorrenti, difficilmente staccabili dal cappello	Grandi, sinuosi, gialli, viranti all'azzurro al tocco	Slanciato, fibroso	Biancastra, imputrescibile	Piccole, brunastre
<b>Gyroporus</b>	Carnoso, asciutto, vellutato	Lunghi, depressi intorno al gambo	Bianchi, piccoli, rotondi e stretti	Presto cavo o cavernoso, robusto, corticato.	Bianca immutabile o virante	Medie, giallo pallide
<b>Leccinum</b>	Cuticola spesso eccedente oltre l'orlo.	Molto lunghi, molto depressi intorno al gambo.	Bianco-grigi o gialli, piccoli, spesso viranti al grigio.	Slanciato, duro, ricoperto da fiocchi o squamette in rilievo bianche, brune o nerastre.	Spesso leggermente virante al lilacino, rosso, grigio.	Grandi, fusiformi, bruno ocracee
<b>Phylloporus</b>	Vellutato, mai vischioso, bruno rossastro.	Imenoforo a lamelle anastomosate facilmente staccabili dal cappello	Lamelle anastomizzate	Asciutto, striato.	Soda, giallastra, virante al rosso porpora.	Fusiformi, brune.
<b>Porphyrellus</b>	Pruinoso, bruno fuliginoso, o color seppia.	Grigio, bruno-rosato	Grigio-giallastro, poi bruno porpora.	Bruno fuliginoso, asciutto.	Bianca o grigiastra, leggermente virante al rosa.	Grandi, fusiformi, rosso, bruno-porpora.
<b>Strobilomyces</b>	Con grosse squame grigiastre, come una pigna	Lunghi, difficilmente staccabili, grigiastri	Grigiastri, angolosi.	Squamoso, ricoperto da un velo fioccoso.	Molle, grigiastra, virante al rosso nero.	Globose, crestato-reticolate.
<b>Suillus</b>	Vischioso, con cuticola facilmente separabile	Mediamente lunghi, adnati, da grigi a giallo-olivastro	Grigi, gialli, arancione, olivastri.	Asciutto, con o senza anello o con punteggiatura.	Gialla o pallida	Piccole, allungate, bruno cannella o olivastre
<b>Tylopilus</b>	Carnoso, soffice, guancialiforme	Lunghi, rosei, liberi al gambo	Prima bianchi, poi rosa o viranti al rosato, arrotondati.	Clavato, con reticolo ruvido in rilievo.	Molto amara, bianca immutabile	Rosa, lisce, fusiformi.
<b>Xerocomus</b>	Secco, tomentoso, pubescente, cuticola non separabile.	Mediamente lunghi, adnati, gialli, olivastri.	Angolosi, ampi, gialli, olivastri.	Cilindrico, duro, costoloso, pseudoreticolato, rugoso	Leggermente virante al blu	Piccole, bruno olivastre

*In grassetto i caratteri determinanti*